BOLLETTINO

DE

Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

N. 546 pubblicato il 21 Gennaio 1907

Vol. XXII

SPEDIZIONE AL RUWENZORI

DІ

S. A. R. LUIGI AMEDEO DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI

XI.

D.r E. FESTA

NYCTINOMUS ALOYSII-SABAUDIAE, nov. spec.

(DIAGNOSI PREVENTIVA)

Orecchie grandi, arrotondate, riunite alla base del loro margineinterno da una spessa fascia cutanea, formante sulla sua parte anteriore una protuberanza carnosa, sulla parte anteriore de la qualenascono radi peli setolosi. La carena interna è elevata, coll'orlo superiore ingrossato nella parte inferiore, e gradatamente assottigliantesi nella sua parte superiore.

L'antitrago è piuttosto alto, largo alla base, col margine interno obliquo e quasi rettilineo, col margine superiore leggermente convesso.

Il trago è assai piccolo, rivolto allo innanzi, col margine interno un po' concavo, e l'esterno convesso.

Il muso è troncato obliquamente. Il labbro superiore è molto ampio, solcato da profonde rughe, delle quali quelle sulla parte anteriore del labbro stesso sono leggermente oblique allo indietro, e quelle sulla parte posteriore, leggermente oblique allo innanzi.

La membrana alare è inserita alla metà della tibia sul lato anteriore; l'uropatagio comincia alla parte posteriore della tibia un po' al disotto del punto, dove è inserita la membrana alare.

La coda è compresa nell'uropatagio per un quarto circa della sua lunghezza.

Il calcaneo è breve.

Il pelame è di colore castagno chiaro (Russet del Ridgway (*)) colla base dei peli di color fulvo chiaro.

Denti: Incis.
$$\frac{1}{2}$$
, Can. $\frac{1}{4}$, Premol. $\frac{2}{2}$, Mol. $\frac{2}{3}$.

Il cranio è mediocremente allungato. Il 1º premolare superiore è molto piccolo, situato nella linea dentale, in contignità del canino. Gli incisivi inferiori sono bilobati. I canini hanno le basi vicine, più alte degli incisivi.

Le dimensioni dell'esemplare tipo della specie, una femmina di Toro sono le seguenti:

, 10 008 0011	***	
Lunghezza	del capo e del corpo	mm., 69
»	del capo	» 27
»	dell'avambraccio	» 51
»	della tibia	» 18
>	della coda	» 42
»	della porzione libera della coda	» 31,5
>>	delle orecchie, dall'intaccatura dell'an-	
	ti(rago all'apice	» 18
»	del trago, dalla base del margine interno	
	all'apice,	» · ·2

^(*) R. Ridgway - A Nomenclature of Colors for Naturalist, pl. III, n. 16.